


冊數 2  
定價 260!  
備註

本館二部







本草綱目卷之

地黃丸  
一兩加入白沙糖







先期剝取淨肉貯瓷碗內每肉一兩加入白沙糖  
一錢素體多火者併加西洋參片如糖之數罨以  
絲綿一層日日放飯鍋內蒸之蒸至百次者良謂  
之代參膏較生煎者功百倍矣晚時開水淪之其  
汁盡出如遇難產卽併牛膝酒共淪更覺簡便凡  
氣血不足別無痰滯便滑之病者不論男婦皆可  
蒸服殊勝他劑



米飲調服二錢則臨盆迅速

胎元不足者勿服

產後瘀

血不淨變生病者或兒枕痛於本方內加炒紅麴

三錢酒炒馬料豆二合共為末用童便半杯陳酒

半盃調服二三錢即愈唯鳳仙子只於臨盆時用

仙傳通津救命玉靈湯治裂胞生及難產數日血

水已乾產戶枯澀命在垂危者

龍眼肉

去核六兩

生牛膝梢

一兩黃酒浸搗爛

將龍眼肉煎濃

汁沖入牛膝酒內服之得半日即產親救數人無

不奇驗

雄按龍眼甘溫極能補血大益胎產力勝參耆宜



草根

五兩

加水煎之

紫酒

治妊娠腰痛如折

黑料豆

二合炒熟焦

白酒一大碗煎至七分空心服

仙傳回急保生丹

此方得之神感效驗異常

大紅鳳仙子

九寸粒

白鳳仙子

四十粒

自死龜板

一兩麻油塗炙

通梢懷牛膝

三錢

桃仁

一錢五分

川芎

五錢

白歸身

五錢

鳳仙子研末包好臨產時將餘藥稱

明分兩為末配入臨盆時米飲調服二錢遲則再

服一錢交骨不開者即開難產者不過三服臨

盆一月內本方去鳳仙子入益母膏二兩每日早



又按神丹丸兼能調經種子大有殊功

神丹磐石丸

懷山藥

四兩 炒

杜仲

去粗皮淨三兩 鹽水炒斷絲

川續斷

二兩

共

研末糯米糊為丸如棗豆大每服三錢米

湯送下

刀雖平常屢用屢驗乃異人所授也凡胎

欲墮者

服即保住慣小產者宜常服之或每月

服數次

主慣半產之月即服之無不保全

銀芩酒

治妊娠胎動欲墮腹痛不可忍及胎漏下

血

芩根

二兩

紋銀

五兩

酒一碗

如無芩之處用茅



凡易滑胎者自無事且易產

白茯苓

二兩

於朮

一兩米泔浸一日黃土炒香

條芩

一兩酒拌炒

香附

兩童便浸炒

延胡

一兩米醋炒

紅花

一兩隔紙烘乾

益

母草

淨葉去梗一兩

眞沒藥

三錢瓦上焙乾去油

右爲末蜜丸

桐子大每服七丸白滾水下若胎動一日可服三

五次切不可多服一丸至囑

杰按胎滑自是血熱動胎之故方中紅花行血延

胡走而不守恐非保胎所宜况已有香附行氣氣

行血白不滯何取動血之品宜去之爲穩

雄按每服七丸故有奇效而無小損也毋庸裁減



蒼朮

五升

一厚樸

薑製

陳皮

各三觔

甘草

三十兩

右爲末每服五錢加薑三片棗一個煎入鹽一捻

沸湯點服亦得

見丹溪書

安胎方

黃耆

蜜炙

杜仲

薑汁炒

茯苓

各一錢

黃芩

一錢五分

白朮

生用

阿膠珠

一錢

甘草

三分

續斷

八分

胸

中脘

滿加紫蘇陳皮各八分

下紅加艾葉地榆

各二錢并多加阿膠引用糯米百粒酒二杯煎服

腹痛用急火煎

保胎神佑丸

此方屢驗一有孕卽合起每日服之

女科神效

卷下



女和車

麻仁丸

仲景

治便難脾約

大黃

四兩

厚樸

枳實

即大承氣去芒硝也

麻仁

一兩

杏仁

二兩二錢 去皮麩炒

芍藥

蜜丸梧子大每服三五

十丸溫水下

脾約丸 丹溪書名

丹溪麻仁丸

治同上兼治風祕

郁李仁

麻子仁

各六兩 另研

大黃

二兩半以 一牛炒

山

藥

防風

枳殼

七錢 半炒

檳榔

五錢

羌活

木香

各五錢半

蜜丸梧子大服七十九白湯下

平胃散

局方

治脾有停滯痰飲痞膈宿食不消滿悶

唐瀉

加樸硝善腐死 胎論見產類



黃蠟二兩

白礬一兩

先將蠟融化候少冷入礬和

勻為丸酒下每服十丸二十九漸加至百丸則有

力瘡愈後服之亦佳

太乙膏

治癰子瘡神効

丹溪

腦子

一錢

輕粉

乳香

各二錢

麝香

三錢

沒

藥

四錢

黃丹

五兩

右用清油一觔先下黃丹熬

用柳枝攪又用葱兒葱七枝先下一枝熬焦再下

一枝葱盡為度下火不住手攪觀冷熱得所入腦

子等藥攪勻磁器盛之用時旋攤

潤下



琥珀

花蕊石

各一錢

為細末醋糊丸如彈子大每

用一二丸炭火煨紅投入生薑自然汁中浸碎以

童便合酒調灌下

托裏散

治一切惡瘡發背疔疽便毒始發脈弦洪

實數腫甚欲作膿者亦治產後瘀血將成膿

論見前

金銀花

當歸

二兩

大黃

樸硝

花粉

連翹

牡蠣

皂角刺

三錢

黃芩

赤芍

一錢

每五錢

半酒半

水煎

蠟礬丸

治一切瘡癤惡毒先服此丸護膜托裏使

毒不攻心或為毒蟲蛇犬所傷並宜服之



錢二

右爲末用溫酒熱湯各半盞調灌一二錢能下咽  
卽開眼更宜燒漆氣淬醋炭于牀前使聞其氣  
伏龍肝散 治大小產血去過多不止

伏龍肝

黑龍丹 亦名琥珀 治產難及胞衣不下血迷血暈不

省人事一切危急惡候垂死者但灌藥得下無不全

活亦治產後疑難雜證 案見奇證中

當歸 五靈脂 淨者 川芎 良薑 熟地 各二兩

砂鍋內紙筋鹽 百草霜 一兩 硫黃 乳香 各二錢

不斗昇

卷下

五



不省人事

蒲黃

五靈脂

淨者

等分炒爲末煎膏醋調服或用

二三錢酒煎熱服

如神湯

治瘀血腰痛下注兩股如錐刺

延胡

當歸

肉桂

等分水煎服

二味參蘇飲

人參

蘇木

清魂散

嚴氏

治產後惡露已盡忽昏暈不知人

產後氣虛

血弱又感風邪也

澤蘭葉

人參

各二錢半

荊芥

兩

川芎

五錢

甘草



或寒凝惡露不行

花蕊石

四兩

硫黃

壹兩

研細泥封煨赤服一錢童

便下

又葛可久花蕊石散

治畧同上

花蕊石

煨存性研如粉以童便一盞男人入酒

少許女人入醋少許煎溫食後調服三錢甚者五

錢能使瘀血化爲黃水後用獨參湯補之

非寒凝者不宜

此

無極丸

治惡露不行發狂譫語血瘀之重者

矢笑散

局方

治惡露不行心包絡痛或死血腹痛不



沒藥

去油二錢

血竭

壹錢

共研末分兩服糖調酒下

奪命丹

良方

治瘀血入胞脹滿難下急服此即消胞

衣自下

杰按似與前論惡閉致喘證未對姑列此以俟再

考

附子

炮牛雨

乾漆

碎之炒烟盡

牡丹皮

各一雨

右為細末另用大黃末一兩以好醋一升同熬成

膏和前藥丸桐子大溫酒吞五七丸一方有當歸

壹雨

花蕊石散

治血入胞衣脹大不能下或惡露上攻



樸硝 丹皮 當歸 大黃 桃仁生用各三銖 厚

樸 桔梗 人參 赤芍 茯苓 桂心 甘草

牛膝 橘皮各二銖 附子六錢 蟲蟲 水蛭各十枚

右十七味咬咀以清酒五升水五升合煮取三升分四服日三夜一每服相去三時覆被取微汗天寒汗不出著火籠之必下膿血務須斟酌下盡二三服即止如大悶不堪可食酢飯冷漿一口即止然恐去惡不盡忍之尤妙

奪命散 治產後惡露不行眩暈昏冒論見產後眩暈門及惡露

不來



女科車馬三

小蘗

蒲黃

炒黑

藕節

滑石

木通

生地

梔子

炒

淡竹葉

當歸

甘草

各五分

導赤散

錢氏

治小腸有火

便赤淋痛

論見帶下類

生地黃

木通

甘草

淡竹葉

等分煎

血極膏

羅謙甫

治婦人汚

血凝滯胞門致成經閉

見論

經閉類

大黃一味爲末醋熬成膏服之利一二行經血自

下

胞湯

千金

治二三十年

不產育胞中必有積血

見論

求子



小柴胡湯

仲景

治傷寒

風少陽證往來寒熱胸脇

痞滿默默不欲食心煩喜

嘔或腹中痛或脇下痛或

渴或咳或利或悸小便不

利口苦耳聾脈弦或汗後

餘熱不解及春時嗽發瘧

寒熱婦人傷寒熱入血室

小柴胡在經主氣在臟  
主血故更能入血室

柴胡八兩

半夏半升

人參

甘草

黃芩

生薑三兩

大棗十二

枚

理血

小蘗飲子

治男婦下焦

熱結尿血淋漓

痛者為血  
淋不痛者

為溺血論見  
妊娠經來類

女科

卷下

哭



神効活人云有代赭旋覆湯胃寒者先服理中湯後服此湯為良

旋覆花即金沸草三兩 代赭石壹兩 人參二兩 甘草三兩

半夏半升 生薑五兩 大棗十二枚

旋覆花湯金匱要畧

旋覆花 葱 新絳

逍遙散局方 治血虛肝 骨蒸潮熱口乾便澀月經

不調

柴胡 當歸酒拌 白芍酒炒 白朮土炒 茯苓壹錢

甘草炙五分 加煨薑 薄荷煎本方加丹皮梔子名

加味逍遙散



又抑氣散嚴氏治婦人氣盛於血變生諸證頭暈膈滿

香附

四兩

陳皮

壹兩

茯苓

甘草

炙

爲末每服

二錢

抑青丸

大瀉肝火治左脇作痛婦人怒氣傷肝胎

氣上逆致嘔逆水飲不能入黃連一味吳萸湯浸一

宿爲丸

代赭旋覆湯

仲景

治傷寒

發汗若吐若下解後心下

痞鞭噫氣不除

邪雖解胃虛氣上逆

弱不和故也

又周揚俊曰余每借以治反胃噎食氣逆不降者



天仙藤散 陳景初製 本名香附散治子氣腫脹

天仙藤 即青木香 藤洗畧焙 香附 炒 陳皮 甘草 烏

藥 木香 等分 劉末 每服五錢加生薑三片紫蘇

五葉水煎日三服腫消止藥 汪本無木香有木

瓜 三

木香散 王師復 治妊娠四五月後每胸腹間氣刺滿痛

或腸鳴嘔逆減食 此由飲食失節所致

義朮 木香 丁香 甘草 鹽湯下

抑氣散 丹溪 治婦人經將行而痛氣之滯也

四物加胡索 丹皮 條芩



杜刮橘紅 石菖蒲 半夏麴半夏亦可 膽星 茯苓

神 旋覆花各一錢 煎濃清服

理氣

紫蘇飲嚴氏 治胎氣不和 湊上心胸腹滿痛悶名為

子懸胎至四五月君相二火 養胎熱氣逆上之故

紫蘇兩 腹皮 人參 川芎 橘皮 白芍

當歸三 甘草分

剉分三分水一盞生薑四片葱白煎去渣服一方

無川芎名七寶散汪訥菴醫方集解載此蘓葉

止一錢 當歸七分 甘草二分 餘皆五分



右五味水六升煮取二升半分三服

千金橘皮湯 治妊娠嘔吐不下食

竹茹 橘皮 人參 白朮各十 生薑一兩 厚

樸十二銖製

石六味水七升煮取二升半分三服附金匱單用

橘皮湯又橘皮三升 竹茹二升 人參一兩 甘草五兩 生薑半

大棗三十枚 名橘皮竹茹湯均治噦逆後人又因金匱加半夏赤

苓枇杷葉亦名橘皮竹茹湯治虛人嘔逆

六神湯 治產後痰迷神昏譫語惡露不斷者甚或

半身不遂口眼歪斜方論見前

產後案中



九令能食便強健也忌生冷醋滑油膩方論見惡阻門

千金茯苓圓

茯苓 人參 桂心 熬 乾薑 半夏 橘皮 各

兩 白朮 葛根 甘草 枳實 各二兩

石十味蜜丸梧子大 飲服二十丸漸加三十丸日

三 附後不用乾薑半 根止用五物又云 夏橘皮白朮葛

又方 此在景岳全 治孕 婦嘔吐不止惡心少食服此

止嘔清痰

青竹筍 橘皮 各十 銖 茯苓 生薑 各二 兩 半夏

三十 銖



半夏 生薑 各三  
十銖

乾地黄 茯苓 各十  
八銖

橘皮

旋覆花 細辛 人參 芍藥 芎藭 桔梗

甘草 各十  
二銖 車氏祇用八味去細辛川芎桔梗  
之升提芍藥之酸斂尤為盡善

右十二味咬咀以水一斗煮取三升分三服若病

阻積月日不得治及服藥冷熱失候病變客熱煩

渴口生瘡者去橘皮細辛加前胡知母各十二銖

若變冷下利者去地黄入桂心十二銖若食少胃

中虛生熱大便閉塞小便赤少者宜加大黃十八

銖去地黄加黃芩六銖餘依方服一劑得下後漸

息看氣力冷熱增損方更服一劑湯便急使茯苓



五錢 甘草 二錢 每服一兩加薑棗煎

愈風散 華陀 治產後中風口噤角弓反張亦治血暈

不省人事四肢強直 方見產後角弓類亦名如聖散

化痰

二陳湯 局方 治一切痰飲為病咳嗽脹滿嘔吐惡心

頭眩心悸

半夏 薑製 陳皮 去 茯苓 一錢 甘草 五分 加薑

煎 半夏陳皮貴其陳久則無燥散之患故名二陳

千金半夏茯苓湯 治妊娠惡阻煩悶吐逆惡食頭

眩體重惡寒汗出等症



中寒服後稍輕再加當歸 煩躁不大便去桂附

倍芍藥加竹瀝熱去附子入白附子亦可 如不

大便日久胸中不快加大黃枳殼如藏寒下利去

黃芩防己倍附子加朮 嘔逆加半夏 語言蹇

澁手足戰掉加菖蒲竹瀝身痛發搖加羌活 口

渴加麥冬花粉 煩渴多驚加犀角羚羊角汗多

去麻杏加白朮 舌燥去桂附加石膏 參丹溪心法

獨活湯 丹溪 治風虛癱瘓昏憤不覺或為寒熱

獨活 羌活 防風 細辛 桂心 白微 當

歸 川芎 半夏 人參 茯神 遠志 菖蒲



槩六

黃連

一

乾薑

十

川椒

去

當歸

四

苦酒

醋

浸烏梅

一宿

去核

蒸熟

和藥

蜜丸

祛風

小續命湯

千金

治中風不省人事神氣潰亂半身不

遂筋急拘攣口眼喎斜語言蹇澁風溼腰痛痰火併

多六經中風及剛柔二瘕亦治產後中風

論見

麻黃

去

杏仁

去皮尖

炒研

桂枝

白芍

酒

甘草

半

炙

人參

川芎

黃芩

防己

每一

兩

防風

半

附子

半兩炮

去皮臍

每服

三錢

或四五錢

加薑棗煎

溫服

取微汗

筋急語遲脈弦者倍人參去芩芍以避



寒相搏咳者加五味子細辛乾薑小便利去茯苓

下利去芍藥加乾薑嘔去附子加生薑一倍

附子湯 仲景 治少陰病身軀痛手足寒骨節痛脈沉

者及少陰病得之二三日口中和背惡寒者

前方去生薑加人參二兩

烏梅丸 仲景 治傷寒厥陰證寒厥吐蚘 傷寒藏厥者

微而厥至七八日膚冷發燥無暫安時也蚘厥者蚘

上入膈則煩須臾復止得食則嘔而又煩蚘聞食臭

復出也此為藏寒當與此丸溫藏安蚘亦治胃府發咳咳而嘔嘔甚則

長蟲出亦主久利 細辛 桂枝 人參 附子 黃

烏梅 三百個



附子

一枚 主用

乾薑

兩

甘草

二兩 炙

冷服面赤者格

陽於上也加葱九莖以通陽腹痛者真陰不足也

加芍藥二兩以斂陰咽痛陰氣上結也加桔梗一

兩以利咽止痛脈不出加人參二兩以助陽補氣

血嘔吐加生薑二兩以散逆氣

上皆通脈四逆湯加減之法

真武湯

仲景

治少陰傷寒腹痛小便不利四肢沉重

疼痛自下利者此為有水氣或咳或嘔或小便利及

太陽病發汗汗出不解仍發熱心悸頭眩筋惕肉瞤

振振欲擗地氣寒惡寒

此亦腎中陽虛見症仍屬少陰方名真武蓋取固腎之義

附子

一枚 炮

白朮

二兩 炒

茯苓

三兩 兩

芍藥

三兩 炒

生薑

三兩 水



白朮

陳壁土炒二兩

人參

乾薑炮

甘草

炙一兩

每服

四錢本方等分蜜丸名理中丸

附子理中湯

治中寒腹痛身痛四肢拘急

即前方三兩加附子一枚

補中湯

治泄瀉瀉不已者加附子

理中湯加陳皮茯苓

改加青皮陳皮名

治中湯

治太陰傷寒腹滿痞悶兼食積者

四逆湯

仲景

治三陰傷寒身痛腹痛下利清穀惡寒

不汗四肢厥冷或反不惡寒面赤煩躁裏寒外熱或

乾嘔或咽痛脈沉微細欲絕



薄耳其不名桂枝加芍藥而名建中以飴糖為君也今人用建中者不用飴糖失仲景遺意矣

黃耆建中湯

金匱

治虛勞諸不足

準繩曰血不足而

生血此仲景之妙法蓋稼穡作甘甘能補胃胃為氣血之海氣血所從生也即補血湯者五倍於當歸之義

即前方加黃耆兩半

黃耆易當歸名當歸建中

湯

治產後虛羸不足腹中痛引腰背小

理中湯

仲景

治傷寒太陰病自利不渴寒多而嘔腹

痛糞溏脈沉無力或厥冷拘急或結胸吐寒虺及感

寒霍亂



杰按三陰下利而腹痛者裏寒也宜溫也四逆湯  
附子理中湯腸鳴泄瀉而痛者裏虛有寒也宜小  
建中溫中散寒悸者陽氣虛也煩者陰血虛也與  
此湯先建其裏倍芍藥者酸以斂陰陰收則陽歸  
附矣 喻嘉言曰虛勞病至於亡血失精精血枯  
槁難為方矣急宜建其中藏使飲食進而陰血旺  
故但用稼穡作甘之味生其精血而酸辛鹹苦絕  
所不用舍是無良法也

桂枝 生薑 甘草 大棗 芍  
三兩 一兩 十二枚

藥 入飴糖一升微火解服  
此即桂枝加厚



升微煎溫服

杰按陽受氣於胸中陽虛則陰邪得以中之陰寒之氣逆而上冲橫格於中焦故見高起痛嘔不可觸近之症 蜀椒辛熱入肺散寒入脾暖胃入腎門補火乾薑辛熱通心助陽逐冷散逆人參甘溫大補脾肺之氣飴糖甘能補土緩可和中所以太祛下焦之陰而復上焦之陽也

小建中湯

仲景

治傷寒陽脈瀼陰脈弦腹中急痛

傷寒二三日心悸而煩

通治虛勞悸衄裏急腹痛

夢遺失精



生用

杰按陰氣爲陽熱所灼也用此以收攝其欲亡之微陰故沈謂子煩陰虛火甚者宜服此

祇寒

大建中湯

金匱

治心胸中大寒痛嘔不能飲食腹中

寒氣上衝皮起出見有頭足上下痛而不可近者

杰按心爲陽寒爲陰寒乘於心陰陽相激故痛寒乘於脾脾冷不消水穀心脾爲子母之藏爲邪所乘故痛而嘔復不能飲食也

蜀椒

二

乾薑

四

人參

二

煎

去滓

入飴糖

一



芎藭<sub>三兩</sub>

右六味爲散取方寸七酒和日三服

膠艾湯

<sub>金匱</sub>

治婦人衝任虛損經水淋瀝及血虛下

痢并妊娠腹痛爲胞阻

當歸

<sub>三兩</sub>

芍藥

<sub>四兩</sub>

乾地黄

<sub>六兩熟</sub>

芎藭

<sub>二兩</sub>

艾

葉

<sub>三兩</sub>

阿膠

甘草

<sub>各二兩</sub>

右七味以水五升清酒三升合煮取三升去渣納

膠令消盡溫服一升日三

仲景黃連阿膠湯

治傷寒少陰病得之二三日以

上心煩不得臥

黃連

<sub>四兩</sub>

黃芩

<sub>二兩</sub>

芍藥

<sub>二兩</sub>

阿膠

<sub>三兩</sub>

鷄子黃

<sub>二枚</sub>



芎歸湯

一作歸芎湯未知  
是二須考

治產後

血虛頭痛胎動下

血服此即安子死腹中服此即下  
催生神效亦名當

歸湯若腹疼加桂若腹痛自汗頭  
眩少氣加羊肉

當歸

三五錢

川芎

二錢

若為末

名佛手散又名一

奇散又名君臣散

又有神妙  
手散未考

加味芎歸湯 川芎當歸各一兩

白死龜板一具酥

炙生過男女婦人頭髮一握燒

性治分婉交骨  
不開或五七

日不下垂死者每用  
兩水煎服良久自下

當歸為藥散

金匱

治懷妊腹中疴

痛

當歸

三兩

芍藥

一兩

茯苓

四兩

白朮

四兩

澤瀉

半兩



歸脾湯濟生

治心脾受傷不能攝血  
血氣血安行及婦

人帶下

人參

白朮

炒土

茯神

棗仁

炒

龍眼肉

二錢

黃耆

一錢半炙

當歸

酒洗

遠志

一錢

木香

甘草

五分

炙

薑棗煎

四物湯

治一切血虛及婦人經病

當歸

酒洗

生地黃

芍藥

各二錢炒

芎藭

一錢半

奇效四物湯

治失血內崩

當歸

酒洗

熟地黃

芍藥

炒

川芎

阿膠

艾

葉

黃芩

炒各一錢



八珍湯 治心肺虛損氣血兩虛

心主血肺主氣四君補氣四物補血

人參 白朮 茯苓 甘草

當歸酒洗 生地

芍藥 芎藭

十全大補湯

八珍再加黃耆以助陽固表加肉桂以引火歸元

金匱曰虛者十補勿瀉之是也

補中益氣湯 東垣治一切清陽下陷中氣不足之證

黃耆 蜜炙一錢半 人參 甘草 炙一錢 白朮 土炒 陳

皮 白留 當歸 五分 升麻 柴胡 三分 薑三片 棗二

枚煎



絲

生薑

炒蒜

各四兩

蜜調

丸

又丹溪青娥丸止用故紙

四兩

仲

四兩

生薑

二兩半炒

胡桃肉

三十個

蜜丸桐子大每服

四五十丸鹽酒下

黑錫丹

治陰陽不升降上盛下

虛頭目眩運

黑鉛

二兩

硫黃

二兩

將鉛鎔化漸入

硫黃候結成片傾

地上出火毒研至無聲為度

參苓白朮散

治脾胃虛弱飲食

不消或吐或瀉

人參

白朮

土炒

茯苓

甘草

炙

山藥

炒

扁

豆

炒

薏仁

炒

蓮子肉

去心炒

陳皮

砂仁

桔

梗為末每三錢棗湯或米飲調服



不足尺脈弱者宜之

亦治婦人轉胞

前方加黃柏知母各二兩名知柏八味丸治陰虛火盛尺脈旺者宜之

腎氣丸

金匱

桂附八味丸加車前牛膝劑用地黃四兩 山藥

以下皆一兩

茯苓三兩

附子五錢

製

杰按金匱要畧用桂枝無車前牛膝治婦人轉胞

此名加味腎氣丸係治水腫

青娥不老丸

集解祇名青娥丸未知是一是二

治腎虛腰痛

破故紙

十兩酒蒸爲末

胡桃肉

十二兩去皮研爛

杜仲

一兩炒去



以人多樂為痘醫耳

集方

論中所列各方有彼此互見者集錄於此以便簡閱其專治者不復贅

補養

門類及分兩炮製牛參王訥菴醫方集解所錄

六味丸

錢仲陽

治肝腎不足真陰虧損精血枯竭

地黃

砂仁酒拌九蒸九晒八兩

山茱肉

酒潤四兩

山藥

四兩

茯苓

乳丹

皮澤瀉

各三兩

蜜丸空心鹽湯下冬酒下

六味地黃湯

治同上

前方煎服

八味丸

崔氏

前方加肉桂附子各一兩名桂附八味丸治相火



女科要略卷一  
弟則後長沙而精於醫者。一方一論。具掇是中。廼他  
書所無。有挾是而過邯鄲。庶無道少之患哉。其積德  
求子。與夫安產藏衣吉凶方位。皆非醫家事故。削不  
載云。

雄按若帶下。直婦人一病耳。未必人人病此。何以  
扁鵲聞貴婦人。卽爲帶下醫。緣帶下本女子生而  
卽有之事。原非病也。後人以帶脈不主約束一言。  
遂以女人之遺濁。稱爲帶下之證。然則扁鵲之爲  
帶下醫。猶今之幼科自稱痘醫也。痘雖幼科之一  
證。而亦人人必有之事。且世俗無不貴小兒者。所



燦然可觀。是爲大全良方。良方出而閨閣之調將大備矣。然其論多采巢氏病源。什九歸諸風冷藥偏。癘熱未有條分縷晰其宜否者。近代薛已新甫始取良方增注。其論酌寒熱之中。大抵依於養脾胃補氣血。不以去病爲事。可謂救時之良醫也已。第陳氏所載多上古專科禁方。具有源流本末。不可沒也。而薛氏一切以己意芟除變亂。使古方自此湮沒。余重惜之。故於是編附存陳氏之舊。而刪其偏駁者。然亦存十之六七而已。至薛氏之說。則盡收之。取其以養正爲主。且簡而易守。雖女子學習無難也。若易水瀝水師。



深許也。唐大中初，白敏中守成都，其家有因免乳死者，訪問名醫得咎殷備集驗方三百七十八首以獻。是爲產寶。宋時濮陽李師聖得產論二十一篇，有說無方。醫學教授郭稽中以方附焉，而陳無擇於三因方評其得失詳矣。娶醫杜莼又附益之，是爲產育寶慶集。臨川陳自明良甫以爲諸書綱領散漫而無統節目簡畧而未備，醫者局於簡易不能深求，偏覽有纔進一方不效輒束手者，有無方可據揣摩臆度者，乃采摭諸家之善，附以家傳驗方，編葺成篇，凡八門，門數十餘體，總三百六十餘論，論後列方，綱領節目



子

雄黃

錢各五

銅綠

錢四

末之煉蜜丸每重四錢

卽以方內雄黃爲衣坐入玉門重者二次必愈

王宇泰女科證治準繩序云婦人有專治方舊矣史  
稱扁鵲過邯鄲聞貴婦人卽爲帶下醫語兼長也然  
帶下直婦人一病耳調經雜證懷子免身患苦百出  
療治萬方一帶下寧遽盡之乎世所傳張長沙維病  
方論三卷婦人居一焉其方用之奇驗奈弗廣何孫  
真人著于金方特以婦人爲首蓋易基乾坤詩首謁  
睢之義其說曰特須教子女學習此三卷婦人方令  
其精曉卽於倉卒之秋何憂畏也而精於醫者未之



不必治其吹也。

### 陰癢

善邑西門外三里有婦陰中極癢難忍因寡居無人轉述醫者莫知病情治皆不效至蘇就葉天士診微露其意葉用蛇床子煎湯洗內服龜鹿二仙膠四日而愈。

陰蝕有用猪肝煮熟削如挺鑽孔數十納陰中良久取出必有蟲在肝孔內另易一挺納之蟲盡自愈亦良法也。

雄按尚有陰挺一證用飛礬

六兩桃仁

一味



以白粉少許和合相得如棗大綿裹納之

陰吹

胃氣下泄陰吹而正喧此穀氣之實也猪膏髮煎導之

猪膏半觔

亂髮

如鷄子大二枚

和膏中煎之髮消藥

成分再服

雄按陰吹亦婦人恆有之事別無所苦者亦不爲病况屬隱微之候故醫亦不知耳俗傳產後未彌月而啖葱者必患此惟吹之太喧而大便難燥乃稱爲病然仲聖但潤其陽明之燥則府氣自通仍



所云咽中帖帖如有炙肉吐之不出吞之不下是也  
半夏厚樸湯 半夏一升 厚樸三兩 茯苓四兩

生薑五兩

蘇葉二兩

水煎分四服  
日三夜一

臟燥

婦人臟燥悲傷欲哭象如神靈所作數欠伸甘麥大  
棗湯主之

甘草三兩

小麥一升

大棗十枚

水煎三分

服

陰寒

婦人陰寒溫陰中坐藥蛇床子散主之 蛇床之末



柴胡增劇詢其病情云醒時下體惡寒卽憤時亦  
嘗牽被斂衣因悟此證平素必患帶下且完姻未  
久隱曲之事未免過當復值經來過多精血兩虧  
陰陽並竭其惡寒發熱由陰陽相乘所致非外感  
熱邪深入也悞投發散清熱證同亡陽傷寒論云  
亡陽則譫語內經云脫陽者見鬼是也因用腎氣  
丸早晚各二錢神氣卽清隨以薤蓉易桂附數劑  
全愈

此卽前所云似是實非之證  
不可不辨者也堯封自記

咽哽

金匱婦人咽中如有炙肉半夏厚樸湯主之 千金



不應藥入則乾嘔脈象弱而不大因思弱脈多火  
胃液乾燥所以作嘔遂用白虎湯加生地麥冬二  
劑熱退神清唯二十餘日不大便爲苦與麻仁丸  
三服得便而安

一室女發熱經來醫用表散藥增劇譫語夜甚投  
小柴胡不應夜起如狂或疑蓄血投涼血消瘀藥  
亦不應左關脈弦硬搏指詢知病從怒起因用膽  
草黃芩山梔丹皮羚羊角蘆薈甘草歸身等藥煎  
服一劑知四劑愈

張儀表令愛發熱經來昏夜譫語如見鬼狀投小



投以小柴胡湯加生地。二服不汗而熱遂除。  
又一熱入血室證。醫用補血調氣藥治之數日。遂成  
血結胸。或勸用前藥。許曰。小柴胡已遲不可行矣。刺  
期門則可。請善針者治之。如言而愈。或問何爲而成  
結胸。許曰。邪氣乘虛入於血室。血爲邪所迫。上入肝  
經。則譫語見鬼。復入膈中。則血結於胸中矣。故觸之  
則痛。非藥可及。當用刺法。

一婦熱多寒少。譫語夜甚。經水來三日。病發而止。  
本家亦知熱入血室。醫用小柴胡數帖。病增舌色  
黃燥。上下齒俱是乾血。余用生地丹皮麥冬等藥。



女科要略卷下  
陳良甫曰。脈遲身涼而胸脇下滿如結胸狀。讞語者。當刺期門穴。下針病人五吸。停針良久。徐徐出針。凡針期門穴。必瀉勿補。肥人二寸。瘦人寸半。

許學士治一婦。病傷寒發寒熱。遇夜則如見鬼狀。經六七日。忽然昏塞。涎響如引鋸。牙關緊急。瞋目不知人。病勢危困。許視之曰。得病之初。曾值月經來否。其家云。經水方來。病作而經遂止。後一二日發寒熱。晝雖靜。夜則見鬼。昨日不省人事。許曰。此是熱入血室。證。醫者不曉。以剛劑與之。故致此。當先化痰。後治其熱。乃急以呷散投之。兩時許。涎下得睡。卽省人事。次



暮則譫語如見鬼狀者。此爲熱入血室。無犯胃氣及  
上二焦。必自愈。

又婦人中風發熱惡寒。經水適來。得之七八日。熱除  
而脈遲身涼。胸脇下滿如結胸狀。譫語者。此爲熱入  
血室也。當刺期門。隨其實而瀉之。

又婦人中風七八日。續得寒熱發作有時。經水適斷  
者。此爲熱入血室。其血必結。故使如瘧狀。發作有時。  
小柴胡湯主之。

沈按論言勿犯胃氣及上二焦者。謂不可攻下并  
不可吐汗也。然有似是實非之證。不可不辨。



女科車馬 卷一  
衰多益寡如亡血液虧孤陽上冒等證而欲望其  
補血不亦愚哉。芎藭有車輪紋其性更急於當歸。  
蓋物性之偏長於通者必不長於守也。世人不取  
用芎藥而恣用歸芎何其顛倒哉。余謂今人血虛  
而熱者爲多。產後血液大耗孤陽易浮。吳氏此言  
深中時弊。又論達生篇所用方藥未可盡信。皆先  
得我心之固然者。詳見解產難。醫者宜究心焉。

雜病

熱入血室

仲景傷寒論云。婦人傷寒發熱。經水邊來。晝日明了。



盈孟以爲必死。日服人參錢許。竟不死。明年春桃花大放。仍無恙。直至秋分節候。方斃。此婦抑鬱不得志。誠是肝病。然不死於春而死於秋。何哉。豈肝病有二。其太過者死於旺時。其不及者死於衰時耶。此證本屬肝病。繆以坎炁補腎而愈。亦理之不可解者。

外有方附後瘍科方選中

雄按吳鞠通曰。當歸芎藭爲產後要藥。然惟血寒而滯者爲宜。若血虛而熱者。斷不可用。蓋當歸香竄異常。甚於麻辛。急走善行。不能靜守。止能運血。



卽以花瓣摘散鋪貼患處三兩次可愈卽已成硬

塊者亦可消散

曾經治驗數人  
陳載安附識

### 乳巖

坎炆洗淨切薄焙燥研末日喫一條酒下約二十條

效。繆德仁治驗會  
年以內者效

又狗糞東丹獨囊蒜三味搗勻攤布上勿用膏藥令  
粘貼上微痛數日可愈

沈按乳巖初起堅硬不作膿其成也肌肉疊起形  
似山巖病起抑鬱不治之證方書云桃花開時死  
出鮮血者死余見一婦患此已四年診時出鮮血



消屢治經驗野芥菜。一名天芥菜。又名鸚哥草。似芥菜而畧矮小。其根數出如蘭根。用以治乳。想其形似乳囊也。故用有驗。春圃附載

乳癰紅腫方發

活小鯽魚一尾。剖去腸。同生山藥寸許。搗爛塗之。少頃發痒。卽愈。屢驗。無山藥。卽芋奶亦可。

乳癰已成

胡桃膈瓦上焙燥。研末。每服三錢。紅糖調勻。溫酒送下三服。無不全愈。

又方用玫瑰花五七朵。乾者亦可醇酒煎服。燙酒極熱。沖服亦可。



無子喫乳乳不消。令人發熱惡寒。用大麥芽二兩炒  
爲末。每服五錢白湯下。丹溪

乳頭碎裂

丹溪老黃茄子燒灰傅之。綱目丁香末傅之

吹乳

繆仲淳云。妒乳內外吹乳。乳巖乳癰。不外陽明厥陰  
二經之病。橘葉最妙。又用生半夏一箇研末。生葱  
頭一段研裹左右互塞鼻。神驗。又於山中掘野芥  
菜。去葉用根洗淨搗爛。無灰酒煎數滾。飲一二次。卽以  
渣遏患處。凡乳癰未成。或腫或硬。或脹痛者。無不立



入再服失笑散芎歸湯調理之。如肉線斷則不可治矣。

乳汁不通

涌泉散。山甲炮研末。酒服方寸匕。日二服。外以油梳

梳乳卽通。

見經疏

陳自明婦人良方曰。予婦食素。產後七日乳汁不行。赤小豆一升煮粥食之。當夜卽行。一婦乳汁不行。煎當歸八錢服卽通。王不留行白通草穿山甲是要藥。

回乳



歸一錢半升麻五分三帖連服之卽收上得汗通身  
方安。但下翳沾睛處乾者落一片約五六兩重。蓋脂  
膜也。食進得眠。診其脈皆濇。左畧弦。視其形卻實。與  
白朮白芍各半錢。陳皮一錢。生薑一片。煎二三帖以  
養之。

### 水道下肉線

一產後水道中下肉線一條長三四尺。動之則痛欲  
絕。先服笑散數帖。次以帶皮薑三觔研爛入清油  
二觔煎油乾爲度。用絹兜起肉線屈曲於水道邊。以  
前薑薰之。冷則燭之。六日夜縮其大半。二六日卽盡。



若氣血充盛必可生焉。遂用四物湯加入參與百帖。三年後復有子。

治子宮下黃耆一錢。人參一錢。當歸七分。升麻三分。甘草二分。作一帖。水煎食前服。外用五倍子末泡湯洗。又用末傅之。如此數次。宜多服藥。永不下。

產戶下物

丹溪云。一婦三十餘歲。生女二日後。產戶下一物如手帕。下有帕尖。約重一筋。子思之。此因胎前勞乏傷氣。或肝癆所致。卻喜血不甚虛耳。其時歲暮天寒。恐冷乾壞了。急與炙黃耆二錢。人參一錢。白朮五分。當



陳無擇云。產後陰脫如脫肛狀。及陰下挺出。逼迫腫痛。舉動房勞。卽發清水續續。小便淋瀝。硫黃烏賊骨各二兩五味子二錢半。爲末。糝之日三次。

子宮下

丹溪云。一產子後陰戶下一物如合鉢狀。有二歧。其夫來求治。予思之。此子宮也。必氣血弱而下墜。遂用升麻當歸黃耆幾帖與之。半日後其夫復來云。服二次後覺响一聲。視之已收。陰戶訖。但因經宿乾著。蓆上破一片如掌心大。在蓆某妻在家哭泣。恐傷破。不復能生。予思此非腸胃乃脂膏也。肌肉破尚可復完。



而安。蓋令氣血驟長。其脬自完。恐少緩亦難成功矣。  
又產時尿胞被傷。小便淋瀝。用二一蠶繭燒存性作末。  
服一月可愈。繆德仁治驗

玉門不閉

薛立齋云。氣虛血弱。十全大補湯主之。

玉門腫脹焮痛

薛云。是肝經虛熱。加味逍遙散主之。

坐草過早。產戶傷壞。紅腫潰爛。痛不可忍。用蒸包子

籠內荷葉煎湯洗。日三次。兩日可愈。

繆德仁治驗

陰脫



尿血

大全云產婦尿血面黃脇脹少食此肝木乘脾土也  
用加味逍遙散補中湯煎服可愈

尿胞被傷小便淋瀝

丹溪云嘗見收生者不謹損破產婦尿脬致病淋漓  
遂成廢疾有一婦年壯難產得此因思肌肉破傷在  
外者皆可補完尿脬雖在裏諒亦可治遂診其脈虛甚  
予曰難產之由多是氣虛產後血氣尤虛試與峻補  
因以參耆爲君芎歸爲臣桃仁陳皮茯苓爲佐煎以  
猪羊脬煎湯極飢時飲之但劑小率用一兩至一月



各二錢 琥珀

花蕊石各

錢一為細末醋糊丸如

子大每用一二丸炭火煨紅投入生薑自然汁中浸碎以童便合酒調灌下

小便不通

產乳集用鹽填臍中令平葱白搗鋪一指厚安鹽土以艾炷餅上炙之覺熱氣入腹內即通最靈

沈按此法不效必是氣虛不能升舉黃耆補氣之  
中已寓升升之性用為君五錢麥冬能清上源  
用以為臣一錢五分白芍草通利達下用以為佐  
八分水煎



已又心痛作。既而目睛痛如割如刺。更作更止。相去無瞬息閒。每頭痛欲取大石壓良久漸定。心痛作則以十指抓臂。血流滿掌。痛定日復痛。復以兩手自剋目。如是十日不已。眾醫無計。進黑龍丹半粒。疾少閒。中夜再服。乃瞑目寢如平時。至清晨下一行約三升。許如蝗蟲子。病減半。已刻又行如前。痛盡除。黑龍丹治產難及胞衣不下。血迷血暈。不省人事。一切危急惡候垂死者。但灌藥得下。無不全活。

當歸 五靈脂 川芎 良薑

熟地 各二兩 剉碎入

砂鍋內紙筋鹽 固濟火煨過 百草霜 一兩

硫黃 乳香



兆也。敗血阻住陰陽升降道路，不能旋轉。陽盛處自熱，陰盛處自寒。所以偏熱偏寒，用澤蘭、查肉、劉季奴、蘇木、桃仁、琥珀等藥兩劑，病勢減半。繼服不應，遂更醫雜治，以至不起。由今思之，此證不但血阻，必兼痰滯。我師見及阻住陰陽升降道路，病源已經識出，特跳不出產後消瘀圈子耳。倘通瘀不應，卽兼化痰。或者如前案金婦得起，未可知也。此時彭尚初學，我師見識過人，特未悟徹痰滯一證，惜哉。

辭案郭茂恂嫂金華君產七日不食，始言頭痛，頭痛



之室。娩後患此。醫治不能除根。再產亦然。延已數年。繼復懷妊。病發益頻。余用大劑滌痰藥。服月餘。產後安然。病根竟刈。

震澤一婦。產後十餘日。延我師金大文診視。余從據述。新產時證似虛脫。服溫補藥數劑。近日變一怪證。左邊冷。右邊熱。一身四肢盡然。前後中分。冷則如冰。熱則如炭。鼻亦如之。舌色左白。右黑。師問曰。此是何病。用何方治。余曰。書未曾載。目未曾睹。不知應用何方。師曰。奇證當於無方之書求之。經不云乎。左右者。陰陽之道路也。陰陽者。水火之氣。



病痰滯居半千金半夏茯苓湯所以神也至臨產時痰涎與惡血齊出方得無病若止血下而痰飲不下諸病叢生故產後理血不應六神湯爲要藥此證初起不過痰飲阻滯氣道作腫血本無病用五苓腎氣腫減者痰滯氣道得熱暫開故也久投不已血分過熱致吐血兩次至若半身不遂口眼歪斜舌絡不靈俱是痰滯經絡見證卽厥亦是痰迷所致並非虛脫故消痰通絡病自漸愈何奇之有

雄按此等卓識皆從閱歷而來朱生甫令郎仲和



血而定投以消瘀。忽然口閉目開如脫狀。伊母一夜煎人參三錢灌之得醒。醒來索飯喫一小盃。近日又厥。灌人參不醒已三晝夜矣。余遂往診。右手無脈。因腫極不以爲怪。左脈浮取亦無。重按則如循刀刃。余曰。此是實證。停參可醫。遂用膽星半夏石菖蒲橘皮天蟲地龍紫草水煎入竹瀝薑汁一劑。知四劑手足能舉。不換方。十二劑能出外房診脈。諸病悉退。惟舌音未清。仍用前方而愈。金問奇病之源。余曰。人身臟腑接壤。受胎後腹中遂增一物。臟腑之機括爲之不靈。五液聚爲痰飲。故胎前



受風而成宜服此藥戴氏證治要法名獨行散

賈似道悅生隨抄呼爲再生丹

指迷方加當歸等分

沈云丁丑三月練塘金虞旬第四媳產後變證伊  
郎來請先述病狀云上年十月生產甚健至十二  
月初旬面上浮腫驅風不應加麻黃三帖通身脹  
腫小便不利更用五皮雜治反加臍凸更用肉桂  
五苓小便畧通脹亦稍減續用桂附八味其腫漸  
消惟右手足不減忽一日口眼歪斜左手足不舉  
舌不能言因作血虛治變爲俯不得仰數日後吐  
黑血盈盂吐後俯仰自如旬餘復不能仰又吐黑



心眼倒築吐瀉欲死此藥清神氣通血脈其效如神

荊芥炒爲末每服三錢黑豆滓酒調服童便亦

可口噤攢開灌之或吹鼻中李潁湖曰此方

諸書盛稱其妙姚僧坦集驗方以酒服名如聖

散藥下可立效陳氏方名舉卿古拜散蕭存敬

方用古老錢煎湯服名一捻金許叔微本事方

云此藥委有奇效神聖之功一產後睡久及醒

則昏昏如醉不省人事醫用此藥及交加散云

服後當睡必以左手搔頭用之果然咎殷產寶

方云此病多因怒氣傷肝或憂氣內鬱或坐草



脈亦隸少陰。此脈急縮與少陰大有關會。此用麻兼用附之深意也。使置此不講。徒執氣虛血虛以治產後百病。業醫亦覺太易矣。

小續命湯 治產後中風。身體緩急。或頑痺不仁。或口眼喎斜。牙關緊急。角弓反張。

防風一錢 麻黃去節 黃芩 白芍 人參

川芎 防己 肉桂各七 附子炮

杏仁各五 甘草四分 加生薑水煎服

華陀愈風散 治產後中風。口噤。牙關緊閉。手足癱瘓。如角弓狀。亦治產後血暈不省人事。四肢強直。或



氣血兩虛者不可輕用。假使除卻麻黃。何以散客  
寒。除卻附子。何以保真陽。特不可用於有汗之柔  
痙耳。有汗柔痙。更有兩種。一則因虛而受外來之  
風。一則血虛則筋急。並無外感之風。有風者。雖汗  
出。必然惡風。主以華元化愈風散。祇血虛而無風  
者。必不惡風。純宜補血。

又按人身氣血之外。更有真陽。真陰藏在坎中。亦  
立命之根基。胎系於腎。腎司二陰。產育之時。下焦  
洞闢。坎中陰陽有不大損者乎。況背後夾脊四行。  
俱太陽經脈。太陽之裡。卽是少陰。脊裡一條是督。



可廢臨診時詳之

沈按仲景論腰背反張爲瘧。無汗者名剛瘧。主以葛根湯。有汗者名柔瘧。主以桂枝加葛根湯。桂枝湯乃治風主方。故有汗之瘧屬風。葛根湯中用麻黃。麻黃乃散寒主藥。故無汗之瘧屬寒。仲景治少陰傷寒未見吐利之裡證者。用麻黃附子細辛湯。麻黃附子甘草湯。微發汗。蓋寒邪乘少陰之虛而欲入。急以附子保坎中之陽。而以麻黃散外感之寒。眞神方也。小續命湯雖非仲景之製。方中用此二味。正見攻守相須之妙。而叔卿反云麻附二味。



腰背反張

薛云產後腰背反張。肢體抽搐。因亡血過多。筋無所養。使然大補氣血。多保無虞。若發表驅風。百不全一。武叔卿云。寒主收引。背項強直。寒在太陽經也。諸家皆主續命湯。此古法也。郭氏不問產後虛實。邪之有無。概用續命。似覺一偏。至薛氏專主亡血過多。非十全大補不可。是或一見。乃夷堅志按以大豆紫湯獨活湯而愈。亦主於風矣。是續命固不爲妄也。但本方有麻黃附子。氣血兩虛人不可輕用。而郭氏論又囑人速灌取汗而解。偏不以麻黃爲忌。何也。二說俱不



瀝吐出厚痰數碗。嗽仍不止。更用二陳加旋覆當歸少減。稍可喫飯。因嗽不減痰。漸變薄。加入生地四錢。食頓減。嗽轉甚。通身汗出。脈象微弦。用歸身三錢。茯苓二錢。炒甘草一錢。紫石英三錢。因汗欲用黃耆。因嗽又止。推敲半晌。仍用炒黃耆三錢。一服汗止而嗽亦大減。十劑而安。

口眼喎斜

丹溪云。必須大補氣血。然後治痰。當以左右手脈分氣血多少治之。切不可作中風治。用小續命湯治風之藥。



宜腎氣湯丸。是證皮薄色白可證。人身營衛之氣通則平。滯則脹。頑痰瘀血皆能阻滯氣道作腫。是證皮厚色不變。以脈弦者爲痰。脈結或芤者爲血。分證分別論治用藥。更有一種血虛而致氣滯者。其腫不甚。色帶淡黃。宜歸身爲君。佐以白朮陳皮茯苓之類。

咳嗽

一婦妊七八個月。咳嗽不止。有時嘔厚痰數碗。投二陳旋覆不應。用清肺滋陰愈甚。遂不服藥。彌月而產。痰嗽如故。日夜不寐。三朝後二陳加膽星竹



如神湯治瘀血腰痛。延胡當歸肉桂等分水煎服。  
沈按腰痛不見前證者。多屬肝腎虛。宜當歸杜仲  
補骨脂之類。

遍身疼痛

薛云以手按之痛甚者。血滯也。按之痛緩者。血虛也。  
浮腫

沈按產後浮腫。先要分水病。氣病。水病。皮薄色白  
而亮如裹水之狀。氣病皮厚色不變。經云腎者胃  
之關也。關門不利。聚水生病。蓋產後腎氣必損。胃  
底陽微。不能蒸布津液。通調水道。此聚水之由也。



如千金硝石丸人參硝黃並用  
學。者。但。將。丹。溪。治。積。聚。諸。案。細。繹。自。有。悟。處。而。黑  
神。九。生。熟。棗。並。用。尤。勿。輕。試。每。見。服。之。謬。事。因。思  
棗。身。爲。癰。之。言。則。飛。補。之。說。其。可。惑。乎。

腰痛

大全產後惡露方行。忽然斷絕。腰中重痛。下注兩股  
痛如錐刺入骨。此由血滯經絡不  
宜桃仁湯五香連翹湯  
即通之。必作癰疽。

沈按前方不穩。不若用桃仁紅花地龍肉桂沒藥  
當歸爲妥。



雄按古今醫案載一婦產後惱心左少腹結一塊  
每發時小腹脹痛從下攻上膈乳上皆痛飲食  
入胃卽吐徧治不效葉香巖用炒黑小茴一錢桂  
酒炒當歸二錢白製鹿角霜菟絲子各一錢五分  
生查肉三錢川芎八分水煎送阿魏丸七分八劑  
而愈次用烏雞煎丸原方半料水不復發又云消  
積之方如桃仁煎用大黃蠱蟲巴霜東垣五積丸  
俱用川烏巴霜局方聖散子三棱煎丸俱用礞砂  
乾漆此皆峻厲之劑用而中病固有神效若妄試  
輕嘗鮮不敗事試閱葉案積聚門竝無古方狠藥



婦科要略卷一  
遙歸脾加減治驗

小腹痛瘀血成膿

薛案載一產後小腹痛。行氣破血不應。脈洪數。此瘀血成膿也。用瓜子仁湯二劑。痛止。更以太乙膏下膿而愈。產後多有此證。雖非癰。用之神效。脈洪數已。有膿。脈但數微有膿。脈遲緊。但有瘀血。尚未成膿。下血即愈。若腹脹大。轉側作水聲。或膿從臍出。或從大便出。宜用蠟礬丸。太乙膏及托裏散。凡瘀血宜急治。緩則化爲膿。難治。若流注關節。則急骨疽。失治多爲壞證。



二錢炙甘草四分加研爛松子仁五粒

蕭賡六云下血過多肝經血少腹痛其脈弦者以熟地莢肉爲君加白芍木瓜蒺藜一劑可止有難產久坐風入胞門致腹痛欲絕其脈浮而弦續斷一兩防風五錢服之立愈

腹中虛痛胸項結核

辭按一產婦腹中有物作痛投破氣行血藥尤甚肢節胸項各結小核隱於肉裏此肝血虛也蓋肝爲藏血之臟而主筋血虛則筋急而攣見於肢節胸項者以諸筋皆屬於節而胸項又肝之部分也用八珍逍



爲藏血之臟。血去肝虛。其氣易動。一關氣惱。陡然  
腕腹大痛。治法血虛宜歸耆建中。消食惟查肉炭  
最妙。兼和血也。消瘀宜奪命散。感寒者輕則炮薑  
艾葉。重則桂附茱萸。肝氣痛。養血藥中加川棟  
橘核。苦以泄之。重則烏梅元辛散。酸收苦泄並用。  
杰按一婦產後腹痛。令其夫以手按之。小腹痛尤  
甚。下惡露而痛仍不減。知其非瘀。乃燥糞也。子藥  
一劑。大便秘下而愈。姜用川治驗。炮薑五分丹  
皮二錢。歸身三錢。川芎一錢五分。山查二錢。炒枳  
殼一錢五分。炒麻仁二錢。梓爛桃仁泥二錢。生地



褚侍中云。童便降火甚速。降血甚神。故爲療厥逆  
頭疼之聖藥。若血虛受風。宜一奇散。卽芎歸湯也。  
薛按。載一產婦頭痛。日用補中益氣已三年。稍勞則  
惡寒內熱。擬作陽虛治。加附子一錢於前湯中。數劑  
不發。

胃脘痛腹痛少腹痛

沈按。有血瘀血虛。停食感寒。肝氣之異。手按痛減  
者。血虛也。按之痛增者。非停食卽瘀血。停食則右  
關脈獨實。且有噯哺氣。瘀血則所下惡露必少。得  
熱卽減者。感寒也。至若厥陰肝脈抵小腹挾胃。又



呻吟調下。此藥雖微。能愈大病。慎弗忽視。

千金膠蠟湯治產後利。黃蠟二。碁子大。阿膠二。

錢。當歸二錢。半。黃連三錢。黃檗一錢。陳米半升。煎。

湯煎藥服。

便溺。

金匱云。亡津液。胃燥故也。

沈按。當歸。當歸肉。苳蓉。生首烏。麻仁。杏仁。不應用。

麻仁丸。四五十丸。

頭痛。

沈按。陰虛於下。則陽易升上。致頭痛者。童便最妙。



意忽大便澹泄數次覺神氣不寧問其所苦曰熱

白渴語言皆如抖出脈虛細數有七至我師金大

文診之曰此陽脫證也屬少陰用生附子三錢水

切片煨如炮乾薑八分炒甘草一錢炒白芍一錢

五分水煎衝入尿一調羹青魚膽汁四小茶匙因夜

中無豬胆故以此服畢即睡覺來熱渴俱除續用

黃耆建中湯加丹參蘇木二劑而安

產後惡露不行餘血滲入大腸洞泄不禁或下青

黑物的奇散極驗荆芥大者四五穗於盞內燃火

燒成灰不得犯油火入麝香少許研勻沸湯一兩



三個月一劑病減而愈

雄按觀此案。雖可見氣虛不能收攝者宜甘溫以補之。酸澀以收之。不可用辛熱走泄以助火而食氣也。

鄒氏婦產後便泄。余用參附溫補藥未效。新城吳一診云。虛寒而兼下陷。用補中益氣加熟地。茯苓桂附。應手取效。以是知方論內言下虛不可升提。不盡然也。

陸姓婦產後三日發疹。細而成粒。不稀不密。用荆芥蟬蛻粘子等藥一劑。頭面俱透。越一日漸有回



三錢南棗肉三錢煎服神效

與眩暈內呂姓婦一按參證

### 泄瀉

乙亥初夏。傅木作婦產時去血過多。隨寒戰汗出。便瀉不止。余用太劑真武。乾薑易生薑。兩劑戰少。定而汗瀉如故。又服兩日。寒戰復作。余用補中湯。無人參加附子。兩劑病者云。我肚裡大熱。口渴喜飲。然汗出。不利寒戰。仍不減。正凝神思慮間。其母曰。彼大孔如洞。不能收閉。諒無活理。余改用黃耆五錢。炒北五味。西錢。搗白芍二錢。炒歸身一錢五分。炒甘草一錢五分。炒茯苓二錢。山藥二錢。大棗



仲景曰病有酒發惡寒而後發熱者陽脈不足陰往乘之陰脈不足陽往乘之

沈按前條是瘀血得寐是陰陽相乘甚則俱有戰慄者治瘀血宜奪命丹調補陰陽輕則歸耆建中重則桂附八寶

### 頭汗

王海藏云頭汗出至額而還額上偏多蓋額爲六陽之會由虛熱蒸蒸而出也

沈按汗出不止屬氣血兩虛黃耆炒五錢白芍酒

二錢歸身二錢棗仁

炒二錢甘草炒一錢小麥炒



卽顯露者。惟舌苔。頗有可徵。或厚白而膩。或黃膩。黃燥。或有赤點。或微苔。舌赤。或口苦。或口渴。或胸悶。或洩熱。此皆溫淫著熱之邪內蘊。世人不察。再飲以糖酒生化湯之類。則輕者重。而重者危。不遇明眼人。亦但知其產亡。而不知其死於何病。誤於何藥也。我亮實多。每爲太息。其後條之乍寒乍熱。亦當如是。諸察庶免遺人夭殃也。

乍寒乍熱

武叔卿曰。血閉。蓋陽經榮衛行之不通。則寒。血閉於陰經。榮衛行之不通。則熱。必瘀通而後寒熱自己。



茯苓乾薑五味數味。惡苦多。贊。

發熱

沈按產後發熱。所因不同。當與證參看。感冒者鼻塞。亦不可過汗。經有奪血無汗之禁。只宜芎歸湯。停食者。噯腐飽悶。宜平劑消食。血虛發熱。無別證者。脈大而芤。宜歸芪。陰虛者。煩渴。脈細。宜生地阿膠。更有一種表熱裏寒。下利清穀。煩渴。惡熱。脈微細者。此少陰危證。宜四逆湯。雄按暴感發熱。可以鼻塞驗之。苟胎前伏邪。婉後陡發者。何嘗有頭疼鼻塞之形證乎。雖脈亦有不



喘

沈按有脫閉二證。下血過多者是脫證。喉中氣促。命在須臾。方書雖有參蘇飲一方。恐不及待。惡露不快者是閉證。以奪命丹可定。如不應當作痰治。此皆急證。更有一種緩者。婁全善所云產後喘者多死。有產二月洗浴。即氣喘坐不得臥者。五月惡風得煖稍緩。用丹皮、桃仁、桂枝、茯苓、乾薑、枳實、厚樸、桑皮、紫蘇、五味、瓜蒌煎服。即臥。其疾如失。作汚血感寒治也。按此亦是痰證。所以能持久。痰滯陽經。所以惡寒。方中著力在瓜蒌、厚樸、枳實、桂枝。



呃逆

虛脫惡候人參送黑錫丹十全一二

杰按姜用川采萃一開載黑鉛乃水之精入北方壬癸凡遇陰火衝逆真陽暴脫氣喘痰鳴之急證同桂附回陽等藥用之立見奇功卽經云重劑是也

又按姜又載何惟丹先生呃逆治驗方云傷寒呃逆聲聞數家者用刀豆子數粒瓦上煨存性爲末白湯調下二錢立止又本草綱目云病後呃逆刀豆連殼燒服姜云此方宜入旋覆代赭湯



謹語惡露不斷余用理血藥不應改用六神湯四劑病去如失

不能語

武叔卿曰熱痰迷心使然 膽星一錢 橘紅一錢  
半夏一錢五分 石菖蒲一錢 鬱金一錢 水  
煎入竹瀝一調羹生薑汁三小茶匙服 按神昏不  
語有虛有實當參旁證及脈

聲啞 按屬腎虛補腎之中宜兼溫通

元生地四錢 茯苓二錢 山藥一錢五分 歸身

錢二 肉桂五分 遠志五分 水煎服



一成衣婦產後半月餘發狂打罵不休其夫鎖之磨上余付無極丸六錢分兩服酒下服畢卽愈越四五日復發又與六服後不復發

丁姓婦產後神昏譫語如狂惡露仍通亦不過多醫者議攻議補不一金尚陶前輩後至診畢曰待我用一平淡方喫下去看用杜刮橘紅石菖蒲等六味一劑神氣清四劑霍然此方想是屢驗故當此危證絕不矜持歸語舍弟賡虞答曰此名六神湯余未考其所自

甲戌孟春錢香樹先生如君產後微熱痞悶時時



開乃父何新之視脈虛弦浮大因拉余商治詢其  
惡露雖無而脘腹無患乃投以牡蠣石英龜板鼈  
甲琥珀丹參甘草紅棗小麥之劑覆杯卽減數日  
霍然此由血虛有素旣挽則營陰下奪陽越不潛  
設泥新產瘀衝之常例而不細參脈證則殺人之  
事矣

發狂譫語

惡露不來者是血瘀宜無極丸惡露仍通者是痰迷  
宜六神湯半夏麴一錢橘紅一錢膽星一錢石菖蒲  
一錢茯神一錢旋覆花一錢水煎濾清服



庚辰春呂姓婦分娩。次日患血暈。晷醒一刻。又目  
閉頭傾。一日數十發。其惡露產時不少。今亦不斷。  
脈大左關弦硬。用酒化阿膠一兩。衝童便服。是夜  
暈雖少減。而頭汗出。少腹痛有形。寒戰如瘧。戰已  
發熱更甚。投沒藥血竭奪命散二錢。酒調服。寒熱  
腹痛發暈頓除。惟嫌通身汗出。此是氣血已通而  
現虛象。用黃耆五錢炒歸身二錢甘草一錢炒棗  
仁三錢炒小麥五錢大棗三個煎服。汗止而安。  
雖按惡露雖少。而胸腹無苦者。不可亂投破瘀之  
藥。今秋周鶴庭室人新產。眩暈自汗。嬾言。曰不能



衛散亂營氣先絕故不

詳立齋云急用一味參

蘇飲加附子亦有得生者

眩暈昏冒

去血過多者宜重用阿膠水化畧加童便服

血去不多者宜奪命散沒藥去油二錢血竭一錢共

研末分兩服糖調酒下

二條宜與前惡露過多二條參看

錢姓婦產後發暈兩日不醒產時惡露甚少暈時

惡露已斷伊夫向鄰家討琥珀散一服約重二錢

許酒調灌下卽醒其藥之色與香俱似沒藥大約

卽是血竭沒藥之方



疼脹者祇宜丹參丹皮元胡滑石益母草山查澤  
蘭桃仁歸尾通草之類爲治慎毋妄施峻劑生化  
湯最勿擅用

九竅出血

彙補云九竅出血死證恆多惟產後瘀血妄行九竅  
出血有用逐瘀之藥而生者不可遽斷其必死此是  
閱歷後之言不可忽畧雖無方藥其法已具

黑氣鼻衄

郭稽中云產後口鼻黑氣起及鼻衄者不治蓋陽明  
爲經脈之海口鼻乃陽明所見之部黑氣鼻衄是營



一老嫗云產時被侍者挾落腰子使然用烏梅肉二

個煎湯服立效

嘉郡錢  
哉目睹

鄰

惡露過多不止

伏龍肝二兩煎湯澄清。拌入阿膠一兩服如不應加

人參

惡露不來

輕則艾葉及奪命散重則無極丸寒凝者肉桂紅花  
等藥併花蕊石散

雄按產後苟無寒證的據一切辛熱之藥皆忌惡  
露不來腹無痛苦者勿亂投藥餌聽之可也如有



急以物半扎臍帶墜住使不上升然後將臍帶剪斷使血不入胞菱縮易下若水繫先斷胞升湊心必死

杰按保生錄覺胎衣不下產婦用自己頭髮塞口

中打一惡心卽下切須放心不可驚恐不可聽穩

婆妄用手取多致傷生又以草紙燒烟熏鼻卽下

芒硝三錢童便冲服立效

愈遂良先生目睹

松郡一老穩婆包醫是證自帶白末藥一包買牛膝

二兩同煎去渣冲童便半盃服立下

白末藥定是元明粉元明松

製丸

硝也

產後喜笑不休



硝爲腐死胎之藥

太按佛手散亦下死胎胎死先宜服此不傷氣血服此不下次用平胃撲硝可也

凍產治驗 劉復真治府判女產死將殮取紅花濃煎扶女於凳上以綿帛蘸湯盪之隨以澆帛上以器盛之又煖又淋久而蘇醒遂產一男蓋遇嚴冬血凝不行得溫故便產也

逆產足先出用鹽塗兒足底橫產手先出塗兒手心太按鹽螯手足痛便縮人俗乃謂之討鹽生也

胞衣不下



良驗此藥不寒不熱最是穩劑

雄按催生藥不宜輕用必胎近產門而不能卸下始可用之又須量其虛實或補助其氣血或展拓其機關寒者溫行熱者清降逆者鎮墜未可拘守成方而概施也

婦人良方曰加味芎歸湯入龜板治交骨不開 醋

油調滑石塗入產門爲滑胎之聖藥 花蘆石散治

血入胞衣脹大不能下或惡露上攻 葶麻子治胎

衣不下 佛手散治血虛危證 清魂散治血暈諸

證 失笑散治惡露腹痛不省人事 平胃散加樸



當歸四錢 人參一錢 牛膝二錢 川芎一

錢 龜板三錢 赭石三錢 研肉桂一錢 去皮

益母二錢 水煎服

雄按此方極宜慎用。夏月尤忌。必審其確係虛寒者始可服之。通津玉靈湯最妙。余用猪肉一味煎清湯服亦甚效。

如神散 路上草鞋一雙 名千里馬 取鼻梁上繩洗淨燒灰。童便和酒調下三錢神驗。武叔卿濟陰綱目云。於理固難通。於用實靈驗。按千里馬得人最下之氣。佐以童便之趨下。酒性之行血。故用之。



交骨如環不能開拆。名鎖子骨。能受孕而不能產。如懷娠必以娩難死。此乃異稟。萬中不得其一。如交骨可開者。斷無不能娩者也。方書五種不孕之所謂螺者。卽螺字之譌也。蓋驢馬交而生騾。純牝無牡。其交骨如環無端。不交不孕。稟乎純陰。性極馴良而善走。勝於驢馬。然亦馬之屬也。易曰坤爲馬。行地無疆。利牝馬之貞。皆取象於此之謂也。人賦此形而不能安其貞。則厄於娩矣。

催產神方

治胎漿已出。胎不得下。或延至兩三日。

者一服卽產。

屢用有神效。



哉言乎若得兒身順下縱稽時日不必驚惶安心  
靜俟可耳會稽施圃生茂才誕時其母產十三日  
而始下母子皆安世俗不知此理稍覺不易先自  
慌張近有凶惡穩婆收爲惘嚇妄施毒手要取重  
價嚮而出之索謝去後產母隨以告殯者有之奈  
貿貿者尚誇其手沒之高忍心害理慘莫慘於此  
矣設果胎不能下自有因證調治諸法卽胎死腹  
中亦有可下之方自古方書未聞有醫割之刑加  
諸投生之嬰兒者附識於此冀世人之憬然悟而  
勿爲凶人牟利之妖言所惑也但有一種騾形者



心懼而氣結不行也。經云：恐則氣下，恐則精怯。怯則上焦閉，閉則氣逆；逆則下焦脹，氣乃不行。得紫蘚飲一服便產。方見子懸門

雄按：難產自古有之。莊公寤生見於左傳，故先生如達不圻不副。詩人以爲異徵，但先生難而後生易，理之常也。晚嫁者尤可必焉。然亦有雖晚嫁而初產不難者，非晚嫁而初產雖易，繼產反難者，或頻產皆易，間有一次甚難者，有一生所產皆易，一生所產皆難者。此或由稟賦之不齊，或由人事之所召，未可以一例論也。諺云：十個孩兒十樣生。至



水十分和勻喫產母面每喫一縮三喫盡收孕婦止  
腹痛未必產連腰痛者將產胞繫於腎故也腹痛試  
捏產母手中指中節或本節跳動方臨盆卽產

雄按中指跳動亦有不卽產者更有腰腹不甚痛  
但覺痠墜而卽產者

兒未生時頭本在上欲生時轉身向下故腹痛難忍  
此時婦當正身寬帶仰臥待兒頭到了產戶方可用  
力催下若用力太早或束肚倚著兒不得轉身卽有  
橫生逆生手足先出之患

許叔微曰有產累日不下服藥不驗此必坐草大早



欲產非果產也。三爲試月。遽爾用力。是謂傷產。三曰  
催產。正產之候。忽見而難產。用藥催之。是謂催產。四  
曰凍產。冬產血凝不生。五曰熱產。過熱血沸。令人昏  
暈。六曰橫產。兒身半轉。遽爾用力。致先露手。令穩婆  
徐推兒手。使自牽耳。七曰倒產。兒身全未得轉。卽爲  
用力。致先露足。令穩婆推足入腹。八曰偏產。兒未正  
而用力。所致。九曰礙產。兒身已順。不能生下。或因臍  
帶絆肩。令穩婆換之。十曰坐產。急于高處繫一手巾。  
令母攀之。輕輕屈足坐身。可產。十一曰盤腸產。臨產  
母腸先出。然後兒生。產後若腸不收。用醋半盞新汲



女科輯要卷下

靖王士雄孟英參

沈堯封先生輯

錢塘後學徐政杰藹輝補注

男之藩友珊校

產

杰按濟生產經曰胎前之脈貴實產後之脈貴虛胎前則順氣女胎產後則扶虛消瘀此其要也丹溪云產後脈洪數產前脈細小澁弱多死懷妊者脈主洪數已產而洪數不改者多主死

楊子建十產論

曰正產二日傷產未滿月而痛如







卷之八

先女







下

女科輯要

